RIZOSFERA

Prof. Helrijesus A. Lima

O ecossistema solo

Funções da raiz

Suporte físico

Absorção de água e nutrientes

Raiz – pode ocupar 1% do volume total da camada de 0-15 cm

Raiz

Órgãos heterotróficos

**Dependem da translocação de
fotossintatos da parte aérea**

Metabolização

Exudatos

CO₂

Liberção de Exudatos

De 5 à 40% do total da matéria seca produzida pela fotossíntese, pode ser convertido em exudatos.

RIZOSFERA

(L. HILTNER –1904)

Região do solo cuja atividade biológica é influenciada pelas raízes das plantas

Rizoplano

Zona de contato íntimo com a superfície das raízes

Rizosfera

Solo adjacente (zona exterior)

REPRESENTAÇÃO DIAGRAMÁTICA DA RIZOSFERA

EFEITO DAS RAÍZES DAS PLANTAS SOBRE OS MICRORGANISMOS RIZOSFÉRICOS

• Efeito rizosférico → **Substâncias orgânicas**

- **Exudatos** – compostos de baixo peso molecular (monossacarídeos) que vazam passivamente das células
- **Secreções** – compostos de alto e baixo peso molecular liberados através de processos metabólicos
- **Lisados** – compostos liberados por autólise de células epidermais, oriundas da ruptura do plasmolema

COMPOSTOS COMUMENTE ENCONTRADOS NA RIZOSFERA DE PLANTAS

- **Aminoácidos** – todos de ocorrência natural
- **Ácidos orgânicos** – acético, butírico, cítrico, fórmico láctico, etc.
- **Carboidratos** – frutose, glicose, galactose, maltose, manose etc.
- **Derivados de ácidos nucleicos** – adenina, guanina, citosina, uridina
- **Vitaminas** – biotina, colina, inositol, etc.
- **Enzimas** – amilase, invertase, fosfatase, protease, etc.
- **Outras substâncias** – auxinas, CO₂, álcool, glutamina, etc.

• População microbiana (relação R/S)

Tabela 8.11. Densidade de vários grupos de microrganismos na rizosfera de trigo e lupinos (modificado de Gray & Williams, 1975; Papavizas & Davey, 1961).

Organismos	Nº de propégulos x 10 ⁶ .g ⁻¹		Relação R:S aproximada
	Rizosfera	Solo	
..... Trigo			
Bactérias	1200	53	23:1
Actinomicetos	46	7	7:1
Fungos	1,2	0,1	12:1
Protozoários	0,0024	0,001	2:1
Algas	0,005	0,027	0,2:1
Amonificadores	500	0,04	12500:1
Aeróbias produtoras de gás	0,39	0,03	13:1
Aeróbias	12	6	2:1
Desnitrificadores	126	0,1	1260:1
Aeróbias celulolíticas	0,7	0,1	7:1
Aeróbias celulolíticas	0,009	0,003	3:1
Produtoras de esporos	0,930	0,575	2:1
Gêo "Radiobacter"	17	0,01	1700:1
..... Lupinos			
Bactérias	159000	27300	6:1
Actinomicetos	46700	9100	5:1
Fungos	0,3	0,09	3:1
<i>Aspergillus ustus</i>	0,006	0,001	6:1

- **Microrganismos encontrados na rizosfera**

- **Bactérias** – Bacillus, Pseudomonas, Erwinia, Celulobacter, Arthrobacter, Micrococcus, Rhizobium, Azospirillum etc.
- **Fungos**– Altrnaria, Aspergillus, Penicillum, Fusarium, Tricoderma, Glomus, Acaulospora, Gigaspora etc.
- **Actinomicetos**– Streptomyces e Actonomyces
- **Microfauna**– Nematóides, protozoários

- População microbiana em função da espécie e idade da planta

Figura 8.6. Número de microrganismos (bactérias e actinomicetos) antagonistas a *Azotobacter* na rizosfera de plantas em diferentes estádios de crescimento e em dois tipos de solo (Extraído de Strzelczyk, 1961).

• Transferência de fotossintatos, raiz X rizosfera

CARBONO FOTOASSIMILADO

100

RAIZES-20-40%

CRESCIMENTO

RESPIRAÇÃO

CO₂

EXUDATOS

MUCIGEL

TECIDOS

MICROORGA

M.O. DO SOLO

CO₂

CO₂

COMPOSTOS LIVRES

EFEITO DOS MICROORGANISMOS SOBRE AS PLANTAS

-
- Patógenos da raiz (equilíbrio biológico/doenças do sistema radicular)

Interações microbianas:

Neutralismo – inteira interdependência

Simbiose – Dependência mútua

Comensalismo – Uma espécie é beneficiada e a outra indiferente

Antibiose – Uma espécie é suprimida e a outra não é afetada

Competição – Há supressão de uma espécie em relação a outra

Parasitismo e Predação – Ataque direto de um organismo sobre o outro

Efeito dos exudatos sobre os patógenos de raiz

Microrganismos estimulam a exudação das plantas Barber & Martin (1976)

EFEITOS

Fornecimento de nutrientes e fatores de crescimento específicos antes da colonização

Inibição de microorganismos competidores específicos por substâncias liberadas pelas raízes, tais como: etileno, ácido butírico, etc.

Liberação pelas raízes de substâncias que influem no tropismo de propágulos ou tubo germinativo

ANTAGONISMO MICROBIANO NA RIZOSFERA

CONTROLE BIOLÓGICO

ANTAGONISTA	PATÓGENO	MECANISMO
<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Fusarium</i> <i>graminearum</i>	Antibiose
<i>Pseudomonas putida</i>	<i>Fusarium</i> <i>oxysporum</i>	Antibiose/competição
<i>Agrobacterium radiobacter</i>	<i>Agrobacterium</i> <i>tumefascens</i>	Antibiose/competição
<i>Trichoderma</i> spp.	<i>Gaeumanomices</i> <i>graminis</i>	Parasitismo
<i>Arthrobacter</i> / <i>Streptomyces</i>	<i>Rizoctonia</i> / <i>Phytium</i>	Antibiose
Protozoários	Vários funfos	Parasitismo

FUNGO DE SOLO FITOPATOGÊNICO

**Podridão em milho causada pelo
fungo *Pythium aphanidermatum*.**

- Disponibilidade e absorção de nutrientes

Alta decomposição: 4x mais CO₂

Amonificação – NH₄ – alto efeito rizosférico

Nitrificação – mais limitado (baixa conc. NH₄)

Desnitrificação – Alta liberação de CO₂- microsítios anaérobicos (favorece)

Fixação Biológica – Constante liberação de C; baixa tensão de O₂, baixo teor de N: favorável

Solubilização de fostatos e sulfatos – Alta taxa de decomposição: libera ácidos (favorece)

-
- **Produção de substâncias promotoras e inibidoras do crescimento de plantas**

Promotoras

Giberelinas (+ de 50) – Ác. Giberélico –GA₃: produzido pelo fungo *Giberella fugikouri*

Auxinas – (AIA)- Acido-3- Indolacético: aumenta produção de raízes laterais (*Azospirillum lipoferum* – bac. diazotrófica)

Citocinininas – Ex. Zeatina: promove divisão celular em tecidos de plantas

O QUE SÃO RBPC? (Kloepper & Schroth, 1978)

- **Vivem na rizosfera sem estabelecer relações simbióticas com plantas**
- **produzem substâncias promotoras do crescimento vegetal**
- **Interferem na nutrição das plantas**
- **Fazem controle biológico de fitopatógenos através de produção de antibióticos, competição por nutrientes e sítios de infecção, etc.**
- **São competidores eficientes que deslocam outros organismos**

Figura 8.9. Passos envolvendo a colonização da raiz por bactérias aplicadas na semente. As bactérias devem sobreviver à inoculação sobre as sementes (a). Quando a semente é plantada no solo, as bactérias se multiplicam na rizosfera (b) em resposta aos exsudados da semente, aderem à superfície radicular (c) e colonizam o sistema radicular em desenvolvimento (d). Algumas bactérias colonizam os tecidos internos da raiz e do caule (e) (Kloepper, 1992).

1. Aumento da população do antagonista existente (Manejo do solo por fertilização, rotação aplicação de orgânicos).
2. Introdução em massa do antagonista.
3. Introdução de antagonista e agentes de redução do patógeno.

Figura 8.10. Controle biológico de patógenos (Vancura & Kunc, 1989).

Figura 8.12. Relação entre o potencial de inóculo de *Fusarium oxysporum* na incidência de fusariose em diferentes solos (Alabouvette et al., 1979, em Siqueira & Franco, 1988).

OBRIGADO!!!

Helrijesus A. Lima

(74) 8808-7709